

สรุป Code คำสั่งการใช้ยาผ่านระบบ HOSxP รพ.โคกเจริญ จ. ลพบุรี

หัวข้อ	หน้า
หลักการพื้นฐานในการสั่งใช้ยากรณีทั่วไป	2
การสั่งใช้ยาวันเว้นวัน	3
คำสั่งใช้ยาเช้า-เที่ยง, เช้า-ก่อนนอน, พร้อมอาหาร	3
รายการยาที่มีการ lock วิธีการสั่งใช้เฉพาะไม่ต้องแก้ไข	4
รายการยาฉีด insulin	5
รายการยาพ่นทางปาก	5

หลักการพื้นฐานในการสั่งใช้ยากรณีทั่วไป

หลักที่หนึ่ง	หลักที่สอง	หลักที่สาม	หลักที่สี่
จำนวนเม็ด ยาที่ให้ทานต่อมือ ** 1/2 = ครึ่งเม็ด/ช้อนชา/ช้อนโต๊ะ 3/4 = ค่อนช้อนชา	จำนวนมือ ที่ให้ทานต่อวัน	ช่วงเวลา ให้ยา - a : ก่อนอาหาร - p : หลังอาหาร - h : ก่อนนอน - pr : เมื่อมีอาหาร - ad : วันเว้นวัน	หน่วยนับ การให้ยา - t : tablet (เม็ด) - s : spoon (ช้อนชา) - j : ช้อนโต๊ะ - z : ซีซี

ตัวอย่าง

- แพทย์สั่งใช้ยา furosemide (40) 1/4 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า ให้ศิษย์ 1/41pt จะขึ้นหน้าจอให้เลือกดังนี้

+ furosemide (LASIX) tab. 40 mg. เม็ด 0.1


1/41 pt
 1/41 pt (1/4 เม็ด*1PC) รับประทานครึ่งละ

ตรวจสอบค่าแปลก่อนกดเลือกได้ตรงนี้ค่ะ

รับประทานครึ่งละ หนึ่งส่วนสี่เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร เช้า

คำสั่งใช้ยาวันเว้นวัน

แพทย์สั่งใช้ยา allopurinol (100) 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง วันเว้นวัน หลังอาหารเช้า ให้คีย์ 11adpt จะขึ้นหน้าจอให้เลือกดังนี้




คำสั่งใช้ยาเข้า-เที่ยง เข้า-ก่อนนอน พร้อมอาหาร

- เข้า-เที่ยง จะมีคำว่า “ชท” ระบุท้าย
- เข้า-ก่อนนอน จะมีคำว่า “ขน” ระบุท้าย
- พร้อมอาหาร จะมีคำว่า “(พร้อมอาหาร)” ระบุท้าย หรืออาจเลื่อนดูตามรายการที่ขึ้นให้เลือกหลังคีย์หลักที่ 1-4 เสร็จ

ตัวอย่าง

- แพทย์สั่งใช้ยา furosemide (40) 1 เม็ด หลังอาหารเช้า ครั้งเม็ดหลังอาหารเที่ยง ให้คีย์ 12pt เลือกดังนี้



- แพทย์สั่งใช้ยา Calcium carbonate (600) 1 เม็ด พร้อมอาหารเช้า-เย็น ให้อายุ 12pt เลือกลงนี้

ED 613 NED 0 ยา 613 มีใช้ยา 50

Vital sign BW. 78.30 Height 150.00 BMI 34.80 CC

รายการยาปัจจุบัน รายการยาจากที่อื่น ตัวเลือกอื่นๆ รายการไอเอ็น IPD

วิธีใช้ รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 เวลา หลังอาหาร

รวมมูลค่า 663.00 บาท

ยา 613.00 บาท

12pt (พร้อมอาหาร ข ย) ครั้งละ 1 เม็ด

ตรวจสอบค่าแปลก่อนกดเลือกได้ตรงนี้ค่ะ

รายการยาที่มีการ lock วิธีการสั่งใช้เฉพาะไม่ต้องแก้ไข

ให้กด enter เพื่อให้หน้าจอกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ WARFARIN, KCL elixir, Kalimate

กดยกตัวพิมพ์

ลำดับ ชื่อเวชภัณฑ์

1 ค่ายบริการทั่วไปผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ

2 FLUPHENAZINE DECANOATE 25

3 artane 2 mg. เม็ด

4 FLUoxetine 20 mg. เม็ด

5 Clozapine 100 mg. เม็ด

* + WARFARIN (เม็ดสีฟ้า) 3 mg. เม็ด

กำหนดวิธีใช้

Detail

Usage Code NEW

Usage Name *.....ht(tab)วัน.....ถึง วัน.....)

Usage Line 1 ทานครั้งละ เม็ด

Usage Line 2 ก่อนนอน

Usage Line 3 วัน.....ถึง วัน.....

Doctor jantjant

กรอกวิธีใช้เพิ่มเติมได้เลยค่ะ

ED 613 NED 0 ยา 613 มีใช้ยา


Vital sign BW. 78.30 Height 150.00 BMI

รายการยาปัจจุบัน รายการยาจากที่อื่น ตัวเลือกอื่นๆ รายการไอเอ็น IPD

วิธีใช้ รับประทาน ครั้งละ เม็ด ก่อนนอน วัน.....ถึง วัน..... แพทย์ จรุงรัตน์ สีคลึง


รายการยาฉีด insulin

เนื่องจากฉีดเข้าใต้ผิวหนัง SC ให้ใช้ code “*sc” แล้วเลือกคำสั่งที่ต้องการได้ ดังตัวอย่างนี้



รายการยาพ่นทางปาก

เนื่องจากยาเป็นรูปแบบ metered dose inhaler จึงใช้ code “mdi” ดังตัวอย่างนี้



กรณีเพิ่มเติม

กรณียาที่มีการสั่งใช้เป็นจำนวน ml ปริมาณมาก ให้แปลงหน่วยเป็น “ช้อนชา” หรือ “ช้อนโต๊ะ” เช่น แพทย์สั่งใช้ alum milk 30 ml po prn เนื่องจาก 30 ml = 2 ช้อนโต๊ะ จะใช้ code “21prj” ตามหลักการพื้นฐานหน้า 2



NOTE: โปรดตรวจสอบความถูกต้องจากค่าแปล code ที่อยู่
ด้านล่างทุกครั้ง ก่อนบันทึก
สอบถามเพิ่มเติมโทรเบอร์ภายใน กด 105